

✓ **ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!**      **НЕ ДЕЛАЙТЕ ОШИБОК!**      ✗



**РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ»



## БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО

**в фокусе внимания**  
Россельхознадзора



**ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО БОРЬБЕ НА ЗЕМЛЯХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

Соблюдайте технику безопасности:

- плотная закрытая одежда;
- резиновые сапоги;
- резиновые перчатки с длинной манжетой;
- защита лица (респиратор, щиток или очки).


Не допускайте контакта  
кожи с соком борщевика.

В случае попадания сока на  
кожу – тщательно промойте  
ее водой с мылом.

Избегайте солнечных  
лучей в течение 2-3 суток.

Обработывайте  
гербицидами невысокие  
растения (до 0,5 м).

Работайте с гербицидами  
строго по регламенту.



Обработка высоких цветущих  
растений менее эффективна  
и более опасна для оператора.

Не снимайте защитную одежду  
во время обработки.

Не дотрагивайтесь до лица  
во время работы.

При получении ожогов –  
обратитесь к врачу.



**ЛИКВИДИРУЙ БОРЩЕВИК –  
НЕ ДОВОДИ ДО СУДА И ШТРАФА!**



**ФГБУ «ВНИИКР»**



+ 7 (499) 707-22-27



[vniikr.ru](http://vniikr.ru)

# СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УДАЛЕНИЮ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

## 1 год

### подготовительный этап



Удалить древесную и сорную растительность механическим способом



Обработать борщевик разрешенными гербицидами



Вспахать, подготовить почву к посеву

## 2 год

### переходный этап



Высадить пропашные культуры с соблюдением агротехнологий

#### или



Содержать землю под паром



Применять гербициды согласно регламентам

## 3 год и далее



Посеять культуру сплошного сева: зерновые, зернобобовые

#### или



Провести залужение многолетними травами



Ввести земли в полноценный хозяйственный оборот

**ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ОБОЧИНАМ ПОЛЕЙ И ПОЛЕВЫХ ДОРОГ. НЕ ДОПУСКАТЬ РАЗВИТИЯ ЗАРОСЛЕЙ И ЦВЕТЕНИЯ БОРЩЕВИКА!**

| Д.в. гербицидов                    | Способ действия        | Эффективность | Примечания                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глифосат                           | По листу               | Средняя       | Может понадобиться повторная обработка                                                                                                    |
| Дикамба                            | По листу и через почву | Высокая       | В год применения нельзя высевать чувствительные культуры: сою, подсолнечник, свеклу, картофель, бобовые, гречиху, лен                     |
| Имазамокс, имазапир и смеси с ними | По листу и через почву | Высокая       | Длительное сохранение в почве, ограничения по высеву чувствительных культур в следующий сезон                                             |
| Пиклорам + МЦПА                    | По листу и через почву | Высокая       | Длительное сохранение в почве, ограничения по высеву чувствительных культур в следующий сезон                                             |
| Сульфонилмочевины                  | По листу и через почву | Высокая       | Длительное сохранение в почве, особенно на нейтральных и слабощелочных почвах, ограничения по высеву чувствительных культур в севообороте |

- Эффективность действия гербицидов зависит от выбранного препарата и срока обработки.
- Нельзя применять гербициды в водоохранных зонах, а также на территории жилой застройки и в 300-метровой зоне вокруг нее.
- Недопустимо обрабатывать борщевик гербицидами во время массового цветения (это малоэффективно и губительно для пчёл)!
- Обязательное внесение данных во ФГИС «Сатурн».

**КОНТАКТ С БОРЩЕВИКОМ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ОЖОГАМ, ВЫЗЫВАТЬ ОТЕК И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ!**